≪緊急時個別対応カード≫

＿＿＿組＿＿＿＿＿＿＿（男・女）さん

原因食物（　　）　エピペン（保管場所：　　）　内服薬（　　）

搬送希望病院（　　）

※「慈恵西部医療センター（旧：慈恵第三病院）」記載の場合は，必ずホットラインへ連絡

観察開始時刻　（　：　）

◆救急搬送の受入れ及びアレルギー症状の判断等に困った場合
〈慈恵ホットライン〉
☎　－　－

＿＿＿組＿＿＿＿＿＿＿（男・女）さん
生年月日　　年　月　日（　歳　ヶ月），体重　　kg

応援者
1　緊急対応セットや AED 等を用意
2　保護者へ連絡（　：　）
①＿＿　☎　－　－　　②＿＿　☎　－　－

「1」～「3」を**5分以内**に対応・判断！
迷ったらエピペン　ただちに119番通報！

1　子どもから目を離さず，応援を依頼

2　応急手当（口の中の物を取り除く，患部を洗う，仰向け，顔横，足を上げ安静に，おもらし許容）

※ 症状は急激に変化することがあるため，５分ごとに「３」～「５」の症状があるか，注意深く観察する！

3　下記の症状が１つでもあてはまるか？

全　身
- □ ぐったり　（　：　）
- □ 意識もうろう　（　：　）
- □ 尿や便を漏らす　（　：　）
- □ 脈が触れにくいまたは不規則　（　：　）
- □ 唇や爪が青白い　（　：　）

呼吸器
- □ のどや胸が締め付けられる　（　：　）
- □ 声がかすれる　（　：　）
- □ 犬が吠えるような咳　（　：　）
- □ 息がしにくい　（　：　）
- □ 持続する強い咳き込み　（　：　）
- □ ゼーゼーする呼吸　（　：　）

消化器
- □ 持続する強い(がまんできない)お腹の痛み　（　：　）
- □ 繰り返し吐き続ける　（　：　）

その他
- □ 〔　　〕　（　：　）

なし →「3」の症状がない場合は右へ

１つでもあてはまる場合

①**ただちにエピペンを使用する**（　：　）
※内服薬を飲んだ後にエピペンを使用しても問題ない
②**救急車を要請する（１１９番通報）**（　：　）
③**その場で安静を保つ**
（立たせない 仰向け 顔は横
足を上げる おもらし許容）
④その場で救急隊を待つ
⑤可能なら内服薬を飲ませる（　：　）

応答・呼吸がない場合
- ・心臓マッサージ
  （1 分間に 100～120 回）
- ・ＡＥＤの措置

※救急隊に引継ぐまで継続すること

ただちに救急車で医療機関へ搬送（エピペン投与者随行）

4　下記の症状が１つでもあてはまるか？

呼吸器
- □ 数回の軽い咳（　：　）

消化器
- □ 中等度のお腹の痛み　（　：　）
- □ １～２回のおう吐　（　：　）
- □ １～２回の下痢　（　：　）

目・口・鼻・顔面
- □ 顔全体の腫れ　（　：　）
- □ まぶたの腫れ　（　：　）

皮　膚
- □ 強いかゆみ　（　：　）
- □ 全身に広がるじんま疹（　：　）
- □ 全身が真っ赤　（　：　）

その他
- □ 〔　　〕（　：　）

なし →

１つでもあてはまる場合

①**内服薬を飲ませ，エピペンを準備する**（　：　）
②速やかに医療機関を受診する
（救急車の要請も考慮）
③**医療機関に到着するまで，５分ごとに症状の変化を観察し，「３」の症状が１つでもあてはまる場合，エピペンを使用する**

速やかに医療機関を受診

5　下記の症状が１つでもあてはまるか？

消化器
- □ 軽いお腹の痛み（がまんできる）　（　：　）
- □ 吐き気　（　：　）

目・口・鼻・顔面
- □ 目のかゆみ、充血　（　：　）
- □ 口の中の違和感、唇の腫れ（　：　）
- □ くしゃみ、鼻水、鼻づまり　（　：　）

皮　膚
- □ 軽度のかゆみ　（　：　）
- □ 数個のじんま疹　（　：　）
- □ 部分的な赤み　（　：　）

その他
- □ 〔　　〕　（　：　）

１つでもあてはまる場合

①**内服薬を飲ませる**（　：　）
②**少なくとも５分ごとに症状の変化を観察（１時間程度）し，**症状の改善がみられない場合は医療機関を受診する
③容態が進行し，「３」または「４」の症状にあてはまる場合は，それにあわせた対応をする

安静にし，注意深く経過観察

※網掛けの箇所は，事前に保護者と協議のうえ記入しておくこと。