

《緊急時新規発症等対応カード》

(男・女)さん

◆救急搬送の受入れ及びアレルギー症状の判断等に困った場合
〈慈恵ホットライン〉

☎ - -

観察開始時刻 (:)

1 子どもから目を離さず、応援を依頼

2 応急手当(仰向け, 顔横, 足を上げ安静に, おもらし許容)

3 下記の症状が1つでもあてはまるか?

- | | |
|------------|---|
| 全身 | <input type="checkbox"/> ぐったり (:) |
| | <input type="checkbox"/> 意識もうろう (:) |
| | <input type="checkbox"/> 尿や便を漏らす (:) |
| | <input type="checkbox"/> 脈が触れにくいまたは不規則 (:) |
| | <input type="checkbox"/> 唇や爪が青白い (:) |
| 呼吸器 | <input type="checkbox"/> のどや胸が締め付けられる (:) |
| | <input type="checkbox"/> 声がかすれる (:) |
| | <input type="checkbox"/> 犬が吠えるような咳 (:) |
| | <input type="checkbox"/> 息がしにくい (:) |
| | <input type="checkbox"/> 持続する強い咳き込み (:) |
| | <input type="checkbox"/> ゼーゼーする呼吸 (:) |
| 消化器 | <input type="checkbox"/> 持続する強い(がまんできない)お腹の痛み (:) |
| | <input type="checkbox"/> 繰り返し吐き続ける (:) |
| その他 | <input type="checkbox"/> [] (:) |

1つでもあてはまる場合

- 応援者
- 1 緊急対応セットや AED 等を用意
 - 2 保護者へ連絡 (:)

※ 症状は急激に変化することがあるため、5分ごとに「3」～「5」の症状があるか、注意深く観察する!

4 下記の症状が1つでもあてはまるか?

- | | |
|-----------------|--|
| 呼吸器 | <input type="checkbox"/> 数回の軽い咳(:) |
| 消化器 | <input type="checkbox"/> 中等度のお腹の痛み (:) |
| | <input type="checkbox"/> 1 ~ 2 回のおう吐 (:) |
| | <input type="checkbox"/> 1 ~ 2 回の下痢 (:) |
| 目・口・鼻・顔面 | <input type="checkbox"/> 顔全体の腫れ (:) |
| | <input type="checkbox"/> まぶたの腫れ (:) |
| 皮膚 | <input type="checkbox"/> 強いかゆみ (:) |
| | <input type="checkbox"/> 全身に広がるじんま疹(:) |
| | <input type="checkbox"/> 全身が真っ赤 (:) |
| その他 | <input type="checkbox"/> [] (:) |

1つでもあてはまる場合

5 下記の症状が1つでもあてはまるか?

- | | |
|-----------------|---|
| 消化器 | <input type="checkbox"/> 軽いお腹の痛み (:) |
| | (がまんできる) (:) |
| | <input type="checkbox"/> 吐き気 (:) |
| 目・口・鼻・顔面 | <input type="checkbox"/> 目のかゆみ、充血 (:) |
| | <input type="checkbox"/> 口の中の違和感、唇の腫れ(:) |
| | <input type="checkbox"/> くしゃみ、鼻水、鼻づまり (:) |
| 皮膚 | <input type="checkbox"/> 軽度のかゆみ (:) |
| | <input type="checkbox"/> 数個のじんま疹 (:) |
| | <input type="checkbox"/> 部分的な赤み (:) |
| その他 | <input type="checkbox"/> [] (:) |

1つでもあてはまる場合

「1」～「4」を5分以内に対応・判断! ただちに119番通報!

なし
「3」の症状がない場合は右へ

- ①ただちに救急車を要請する(119番通報)(:)
- ②その場で安静を保つ
(立たせない 仰向け 顔は横 足を上げる おもらし許容)
- ③その場で救急隊を待つ



応答・呼吸がない場合

- ・心臓マッサージ (1分間に100~120回)
 - ・AEDの措置
- ※救急隊に引継ぐまで継続すること

ただちに救急車で医療機関へ搬送(病院へ随行)

- ① 少なくとも5分ごとに症状の変化を観察(1時間程度)し、症状の改善がみられない場合は医療機関を受診する
- ② 容態が進行し、「3」または「4」の症状にあてはまる場合は、それに合わせた対応をする

安静にし、注意深く経過観察

※事前に慈恵ホットラインを記入しておくこと。